近イモノデアルト謂ハレテモ何トモ致方ガアルマイ、是レハ當サニ其學ニ無クテナラナイ一機關ヲ缺デ居ルカラデアル、不具ニ類シタト謂ハレテ憤慨スル人ハ畫ヲ習ッタ〳〵岩崎灌園ハ自分デ草木ノ寫生ヲ能クシタカラ其レデ『本草圖譜』ノヤウナ百卷ニモ近カキ厖然タル大著ガ出來タノダ、アノ書中幾千ノ圖ヲ他人ヲ倩フテ描カシメタラトテモアンナ成功ハ覺束ナカッタデアラウ

右ノ『本草圖譜』ノ圖ハ實ハ尙ホ灌園ノ腕ノさへヲ示シテハ居ナイ事ヲ世人ハ恐ラク能ク知ッテハ居マイ、力ヲ入レテ入念ニ寫生シ大ニ其眞面目ノ發揮シタ灌園ノ圖ハトテモ『本草圖譜』ニ在ルヤウナ粗末ナモノデハナイ、其レ故『圖譜』ノ圖ヲ見テ早急ニ灌園ノ手腕ヲ論ズルコトハ全クからはづみデアルコトヲ私ハ斷言スル又彼ノ飯沼慾齋ノ『草木圖說』トテモ同ジ事デ是レモ亦著者ガ能ク自ラ草木ヲ寫生シタカラ乃チ二三十卷ノ其書モ出來タノデアル、近クハ緒方正資君ノ『日本羊齒類圖集』デモサウデアル、著者緒方君ガ自身デ之レヲ描イタカラ其レガ積ッテ此ンナ有益ナしだノ圖譜ヲ產ミ出シタノデ自分デ圖ノ描ケル貴トサハ此等ヲ見テモ容易ニ了解ガ出來ルデアラウ

○蕾軒獨語（其三十四）

蕾軒　朝比奈泰彥

○吾國最初ノ Xanthoria 屬代表者

歐洲ニハ到ル處ニ見ラルヽ最モ普通ノ地衣ノ一ハ Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. デアッテ教科書等ニモ最モ多ク引用サレ從テ吾國ノ植物書ニモ其種名ヲ飜譯シテかべごけナドト稱シ孫引シテアルガ現今迄此屬ノ代表者ハ未ダ見付カラナカッタノデアル、一昨々年大井一夫君ガ予ニ送致サレタ信州南佐久郡產採集品中ニ不完全ナル Xanthoria 屬ノ地衣ヲ見出シ同君ニ更ニ搜索ヲ願ッタ所可ナリ完全ナル標本ヲ追送サレタノデ十分調査ス



Xanthoria fallax (Hepp) Arn.
おほらふそくごけ　Ca. 1/1
（蕾軒撮影）

却テ後者ニアラズヤト思ハシムルガ、外國産 X. fallax ノ標本デ Magnusson ノスウヱーデン産品、同ジクルコトガデキ果シテ同屬ノモノデ而カモ Xanthoria fallax (Hepp) Arn. デアルコトヲ突止メタ、大井君ノ標品ハ樹皮ニ着生シ表面鮮黃色乃至橙黃色ヲ呈シテ居ル葉狀地衣デ各箇體ハ徑一「セ、メ」又ハコレヨリ小ナル「ロゼット」形デソレガ互ニ不規則ニ斷續シテ居ル各箇體ハ稍放射狀ニ分枝シ各枝ハ更ニ若干決裂シ裂片ハ體ノ中央部デハ往々黃色ノ粉芽ヲ邊緣ニ有シ多少直立スル傾向アルモ體ノ周邊デハ基物ニ着生シ內屈ノ傾向ガアル、表面ニ苛性加里液ヲ點ズレバ紫紅色ヲ呈スル、裏面ハ白色デ短カキ擬根ヲ以テ基物ニ固着スル、子器ハ寧ロ少數デ徑一「ミリ」前後、緣ハ地衣體ト同色、盤（ディスク）ハ少シク濃色デアル、苛性加里ニヨリ地衣體ト同ジク紫紅色ヲ呈スル、子囊ハ棍棒狀八子ヲ容レ、胞子ハ橢圓形デ兩極性二室 (polarilocular) ヲ有シ中央ノ細溝ヲ以テ連絡スル、胞子ノ大サ 13×7μ

本種ヲ記載スルケデ鑑定セントスルト X. candelaria (L.) Arn. (=X. lychnea (Ach.) Th. Fr.) トノ區別ガ困難ヲ感ズル、殊ニ文獻ニハ X. fallax ハ岩石着生デ X. candelaria ノ方ハ樹皮、岩石墻壁等ニ著生トアルノデ吾々ノ場合ニハ



Xanthoria fallax (Hepp) Arn.
ノ絲狀體、子嚢及胞子
（圖原軒蕾）

Vrang 採品（Zahlbr. Lichenes rariores exsiccati. No. 213.）、Tomin 氏採集シベリア産品、Lynge 氏ノルウェー品何レモ樹皮着デアッテ信州産ト一致シ X. candelaria ノ方ノ外國標本デハ Lynge 氏ノルウェー産品ガ岩石着生、又 Schade, Stolle et Riemer: Lich. saxonici exs. No. 281. ガ樹皮着生デアッタガ其裂片ハ何レモ細裂シ且ツ直立シテ居ルノデ明ニ區別スルコトガデキル

本誌第五卷第十號蕾軒獨語（其二十六）ニ掲ゲタらふそくごけ Candelaria concolor (Dicks.) Wain. トノ區別ハ大體ニ於テ後者ノ葉體ガ纖弱ナルト、寧ロ黃綠色ヲ呈スルコト、胞子ガ單室デアリ且地衣體ノ表面ニ苛性加里液ヲ注イデモ着色シナイノデデキル、然シ兩者トモヨク似タモノデアルカラ Xanthoria fallax ノ和名ヲおほらふそくごけト呼ンデ置ク

○蕾軒獨語（其三十五）

蕾軒　朝比奈泰彦

○二三ノ邦産地衣ニツキテ

先頃土佐ノ吉永虎馬君及ビ肥後人吉ノ前原勘次郎君カラ送ラレタ送品中ニ色々ノ珍品ガアリ殊ニ其內ニハ始メテ我國內ニ發見サレタモノモアルノデ玆ニ報吾ヲスル次第デアリマス、其一ハ

Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.